

<ED治療薬>

ED治療薬名	バイアグラ	レビトラ	シアリス
発売年	1999年	2004年	2007年
用量	25mg 50mg (100mg)	5mg 10mg 20mg	5mg 10mg 20mg
標準投与量	50mg	10mg	10mg
効能・効果	勃起不全（満足な性行為を行うに十分な勃起と維持ができない）		
投与時間・間隔	性行為の約1時間前に経口投与 1日1回まで 24時間以上あける		
効果発現時間	30～60分後	15～30分後	30分後
効果持続時間	約4時間	約4～8時間	約36時間
食事の影響	食後の服用で効果減弱	なし（高脂肪食後の服用で効果減弱）	なし
副作用	頭痛、潮紅、消化不良、めまい	頭痛、ほてり、鼻閉、消化不良、めまい	頭痛、消化不良、背部痛、筋痛、潮紅、鼻閉、四肢痛
併用禁忌薬	硝酸剤、一酸化窒素(NO)供与剤	硝酸剤、一酸化窒素(NO)供与剤 抗不整脈薬	硝酸剤、一酸化窒素(NO)供与剤
備考	100mgは国内での販売なし	20mgは65歳以上は不可	
持続勃起症※	ED治療薬服用後に4時間以上勃起が続く場合は、すぐに近くの泌尿器科医に連絡してください		

※性的刺激・性的興奮と無関係である勃起が4時間を超えて持続している状態。

(治療) 翼状針を陰茎海綿体に穿刺し、脱血と生理食塩水で洗浄を行う。

<精神安定剤>

心因性EDにED治療薬と併用

1回、勃起しないと次回も勃起しないのではとプレッシャーがかかります。そういう方におすすめします。

対象	心因性ED、前回失敗した方
禁忌	急性隅角緑内障、重症筋無力症
効果持続時間	約6時間
副作用	眠気、ふらつき、めまい等
併用注意	アルコール（飲酒）にて作用増強
注意	本剤内服後、自動車の運転等危険を伴う機械の操作はしないこと 依存性があるので毎日飲まないこと